

# 新型コロナワクチンについてのよくある質問

厚生労働省<sup>HP</sup> (<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/booster>) より

## なぜ、追加(3回目)接種が必要なのですか

日本で接種が進められているワクチンは、高い予防効果などがある一方、感染予防効果や、高齢者の重症化予防効果について、時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。

このため、感染拡大防止と重症化予防の観点から、初回(1回目・2回目)接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。

## 追加(3回目)接種には、どのような効果がありますか

行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果などを高める効果があります。

## 追加(3回目)接種では、初回(1回目・2回目)接種と同じワクチンが使用されますか。初回接種と異なるワクチンを使用(交接種)しても大丈夫でしょうか

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、mRNAワクチン(ファイザー社のワクチンまたは武田/モデルナ社のワクチン)を用いることが適当とされています。

## ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防の効果が有意に高かったと報告されています。

\*重症化予防には入院予防を含む。

出典:Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

## 追加(3回目)接種では、どのような副反応がありますか。2回目より重いのでしょうか

海外での臨床試験の結果では、ファイザー社のワクチンと武田/モデルナ社のワクチンいずれの場合も、2回目の接種後と比較して有害事象の発現傾向はおおむね同様であると確認されていますが、リンパ節の腫れなどについては、初回(1回目・2回目)接種時と比較して、発現割合が高い傾向にありました。

国内の調査結果(中間報告)でも、ファイザー社のワクチンにおける、追加接種から1週間後までの有害事象の状況は、2回目の接種後とほぼ類似していましたが、わきの下の痛みなどについては、3回目の接種後の方が、発現頻度が高い傾向がみられました。

## 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量になります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

\*接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。

出典：特例承認に係る報告書より

## ◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。発生は極めてまれですが、100%発生を防ぐこともできないため、万一に備えて救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、健康推進課(☎35-3160)にご相談ください。